

Hipertensão ao longo da vida

E na saúde da mulher

Audes Feitosa, MD, PhD, FESC

Diretrizes Brasileiras 2025 e de Medidas da PA 2023

Ao final desta aula

- 01** Aplicar critérios de PA adequados à idade e à gestação.
- 02** Individualizar o tratamento do idoso pela função e pela tolerância.
- 03** Rever contracepção, planejamento gestacional e menopausa.
- 04** Reconhecer gravidade na gestação e planejar o seguimento pós-parto.

O que muda em cada fase

Fase da vida	Pergunta central
Infância e adolescência	Qual referência de PA é apropriada?
Envelhecimento	Qual é a condição funcional e a tolerância?
Vida reprodutiva	Há gestação possível ou planejada?
Gestação e puerpério	Há risco materno ou fetal imediato?

Detectar cedo

O diagnóstico exige técnica adequada e referências específicas da população pediátrica.

Quando medir a PA da criança?

- 01 Anualmente a partir dos 3 anos de idade.
- 02 Antes dos 3 anos, quando houver condições de risco.
- 03 Prematuridade, doença renal e cardiopatias são exemplos.
- 04 Rever também medicamentos que podem elevar a PA.

Medida pediátrica: técnica antes do rótulo

- 01** Escolher manguito adequado à circunferência do braço.
- 02** Usar equipamento validado para a idade pediátrica.
- 03** Confirmar valores elevados com método auscultatório.
- 04** Registrar idade, sexo e estatura para interpretar a PA.

Duas referências no consultório

De 1 a 12 anos

Usar percentis por idade, sexo e altura, comparados aos limites fixos da tabela.

A partir de 13 anos

Usar os valores fixos da classificação pediátrica.

Consultório: classificação de 1 a 12 anos

Categoria	Regra da tabela 9.1
Normal	PAS e PAD abaixo do P90
Pré-hipertensão	P90 a <P95 ou $\geq 120/80$ e <P95*
HA estágio 1	P95 a <P95 + 12 ou 130/80–139/89*
HA estágio 2	$\geq P95 + 12$ ou $\geq 140/90^*$

***Comparar percentis e limites fixos. Vale a categoria mais alta.**

Consultório: adolescentes a partir de 13 anos

Categoria	PAS e PAD, em mmHg
Normal	PAS <120 e PAD <80
Pré-hipertensão	PAS 120–129 e PAD <80
HA estágio 1	PAS 130–139 ou PAD 80–89
HA estágio 2	PAS ≥140 ou PAD ≥90

Confirmação e investigação na pediatria

- 01 Confirmar valores elevados em três atendimentos distintos.
- 02 Avaliar história perinatal, familiar e exame físico.
- 03 Suspeitar mais de causa secundária em crianças pequenas ou com PA muito alta.
- 04 Obesidade e história familiar favorecem HA primária no adolescente.

MAPA pediátrica: quando acrescenta valor?

- 01 Pré-hipertensão persistente por pelo menos um ano.
- 02 HA estágio 1 em três consultas ambulatoriais.
- 03 Suspeita de avental branco ou hipertensão mascarada.
- 04 Condições de alto risco, como DRC e coarctação de aorta.

MAPA: limites a partir de 13 anos

Período	Média elevada, em mmHg
24 horas	PAS $\geq$ 125 ou PAD $\geq$ 75
Vigília	PAS $\geq$ 130 ou PAD $\geq$ 80
Sono	PAS $\geq$ 110 ou PAD $\geq$ 65

Estes limites diferem dos utilizados na população adulta geral.

MAPA e MRPA na pediatria

MAPA

Confirma fenótipos e permite avaliar a PA durante o sono.

MRPA

Pode ajudar no acompanhamento. As referências pediátricas são mais limitadas.

Tratamento pediátrico: hábitos e metas

- 01 Envolver a família nas mudanças de alimentação e atividade física.
- 02 Reduzir sedentarismo e abordar excesso de peso.
- 03 Meta: PA <P90 na criança e <130/80 no adolescente ≥ 13 anos.
- 04 Na DRC, a meta pela MAPA é mais rigorosa e específica.

Quando usar medicamentos na pediatria?

- 01 HA sintomática ou com lesão de órgãos-alvo.
- 02 HA estágio 2 sem causa modificável aparente.
- 03 HA persistente apesar das mudanças de hábitos.
- 04 Escolher a classe conforme etiologia e doenças associadas.

Caso 1: adolescente com PA 134/84

- 01 Adolescente de 15 anos, assintomático, com sobrepeso.
- 02 PA 134/84 em três consultas, confirmada por ausculta.
- 03 Qual é a classificação no consultório?
- 04 Que exame ajuda a confirmar o fenótipo?

Função e tolerância

A idade cronológica, isoladamente, não determina início, intensidade ou retirada do tratamento.

Particularidades da medida no idoso

- 01 Hipertensão sistólica isolada e pressão de pulso ampliada são frequentes.
- 02 Pesquisar hipotensão ortostática e após as refeições.
- 03 Correlacionar sintomas com horários, doses e atividades.
- 04 Usar MAPA ou MRPA sempre que possível.

A avaliação deve incluir funcionalidade

- 01 Autonomia para atividades diárias e manejo dos medicamentos.
- 02 Marcha, quedas e sinais de fragilidade.
- 03 Cognição, estado nutricional e condições sociais.
- 04 Expectativas do paciente e participação do cuidador.

Idosos: meta e individualização

Maioria dos pacientes

Buscar PA <130/80 mmHg.

Fragilidade ou reserva reduzida

Reduzir até o menor valor tolerado, considerando função, sintomas e expectativa de vida.

Prescrição no idoso: progressão cuidadosa

- 01 Começar com monoterapia ou combinação em doses baixas.
- 02 Ajustar gradualmente conforme resposta e tolerância.
- 03 Rever função renal, eletrólitos e interações.
- 04 Vigiar sintomas e quedas após mudanças do esquema.

Mudanças de hábitos sem perder função

- 01 Manter exercícios aeróbicos e resistidos conforme capacidade.
- 02 Evitar perda de peso que agrave sarcopenia ou desnutrição.
- 03 Adequar ingestão de sódio sem restrição extrema.
- 04 Individualizar alimentos ricos em potássio na DRC.

Polifarmácia e adesão

- 01 Revisar todos os medicamentos, inclusive os de outras doenças.
- 02 Procurar duplicidades, interações e efeitos adversos.
- 03 Simplificar tomadas e número de comprimidos quando possível.
- 04 Conferir entendimento e capacidade de organizar o tratamento.

Quando considerar desintensificação?

- 01 Hipotensão sintomática ou efeito adverso relevante.
- 02 PA persistentemente muito abaixo da meta dentro e fora do consultório.
- 03 Mudança clínica que altere a relação entre benefício e risco.
- 04 Cuidados paliativos e fragilidade grave, com prioridade aos sintomas.

Caso 2: mesma idade, planos diferentes

- 01 Duas pessoas de 84 anos apresentam PA 148/82.
- 02 A primeira é independente, ativa e sem tontura.
- 03 A segunda tem quedas, dependência e hipotensão ao levantar.
- 04 Quais dados mudam a intensidade e a velocidade do tratamento?

História reprodutiva

Contracepção, gestação anterior e menopausa fazem parte da avaliação da hipertensão.

Perguntas que precisam entrar na consulta

- 01** Qual método contraceptivo está em uso? Há desejo de engravidar?
- 02** Houve hipertensão ou pré-eclâmpsia em gestação anterior?
- 03** Há síndrome dos ovários policísticos ou menopausa?
- 04** Há sintomas sexuais ou efeitos adversos que comprometem a adesão?

Mulher jovem: avaliação dirigida

- 01 Rever obesidade, apneia do sono e condições endócrinas.
- 02 Investigar nefropatias e sinais de causas secundárias.
- 03 Considerar displasia fibromuscular quando houver suspeita clínica.
- 04 Avaliar risco metabólico na síndrome dos ovários policísticos.

Contraceptivo combinado e PA

- 01 Medir a PA antes de iniciar o contraceptivo hormonal combinado oral.
- 02 A DBHA recomenda reavaliar a PA a cada seis meses.
- 03 Se a PA aumentar, rever o método e os demais fatores de risco.
- 04 Elevação persistente $\geq 160/100$ exige considerar troca ou suspensão.

Planejamento gestacional muda a receita

- 01** Perguntar sobre possibilidade e intenção de gravidez.
- 02** Rever IECA e BRA antes da concepção.
- 03** Definir alternativa compatível com o planejamento reprodutivo.
- 04** Registrar orientações e coordenar o cuidado com obstetrícia.

Menopausa e tratamento da HA

Meta pressórica

As metas são as mesmas de homens e mulheres fora da gestação.

Escolha inicial

A DBHA favorece IECA ou BRA com BCC ou diurético tiazídico ou similar.

Terapia hormonal da menopausa

- 01 A indicação depende de sintomas e avaliação individual.
- 02 Monitorar a PA desde o início.
- 03 HA controlada não impede automaticamente o tratamento.
- 04 A DBHA prefere via transdérmica em certos contextos metabólicos.

Mulheres: tolerância e proteção de órgãos

- 01** Perguntar sobre tosse com IECA e edema com BCC.
- 02** Acompanhar sódio e potássio quando indicado.
- 03** Rever função renal e albuminúria, anualmente quando possível.
- 04** Ajustar efeitos adversos para preservar adesão e controle.

Hipertensão na gestação

Dois pacientes

O cuidado precisa proteger a mãe e acompanhar o desenvolvimento fetal.

Medida da PA durante a gestação

- 01 Medir a PA em cada visita pré-natal, com a gestante sentada.
- 02 Usar manguito adequado e aparelho validado para gestação.
- 03 Na ausculta, usar o quinto som de Korotkoff para a PAD.
- 04 Registrar idade gestacional, sintomas e medicamentos.

Diagnóstico no consultório

$\geq 140/90$

PAS ≥ 140 e/ou PAD ≥ 90 mmHg. Confirmar conforme o contexto clínico.

Quatro apresentações na gestação

Condição	Elemento que orienta a classificação
HA crônica	Prévia ou identificada antes de 20 semanas
HA gestacional	Após 20 semanas, sem critérios de pré-eclâmpsia
Pré-eclâmpsia	HA após 20 semanas + proteinúria ou disfunção orgânica
Pré-eclâmpsia sobreposta	Pré-eclâmpsia em paciente com HA crônica

Pré-eclâmpsia pode existir sem proteinúria

- 01 Avaliar plaquetas, função renal e enzimas hepáticas.
- 02 Pesquisar edema pulmonar e sintomas neurológicos.
- 03 Cefaleia sem causa alternativa e alterações visuais exigem atenção.
- 04 Integrar quadro materno, idade gestacional e avaliação fetal.

Complicações que exigem reconhecimento

Condição	Característica principal
Eclâmpsia	Convulsão sem outra causa em contexto de pré-eclâmpsia
HELLP	Hemólise, enzimas hepáticas elevadas e plaquetopenia
PRES	Síndrome neurológica com edema vasogênico à imagem

MAPA e MRPA na gestação

- 01 Ajudam a identificar avental branco e hipertensão mascarada.
- 02 A DBMPA recomenda MAPA antes de 20 semanas e MRPA após esse período.
- 03 Conferir validação do aparelho e técnica de medida.
- 04 Resultado domiciliar não exclui pré-eclâmpsia diante de sinais clínicos.

Gestação: referências fora do consultório

Método / período	Referência descrita na fonte
MAPA de 24 horas	≥130/80 mmHg na DBMPA 2023
MAPA de vigília	≥135/85 mmHg no quadro 10.1 da DBHA
MRPA	≥135/85 mmHg no quadro 10.1 da DBHA

Informar método, período e referência. Não misturar médias distintas.

Prevenção da pré-eclâmpsia começa cedo

- 01** Avaliar risco preferencialmente entre 11 e 14 semanas.
- 02** Obter história obstétrica e fatores de risco maternos.
- 03** Quando disponível, associar Doppler uterino e PLGF.
- 04** Definir profilaxia e seguimento com a equipe obstétrica.

Risco de pré-eclâmpsia: exemplos da DBHA

Alto risco: um critério	Risco moderado: dois ou mais
Pré-eclâmpsia prévia	Idade materna >40 anos
HA crônica, DM prévio ou DRC	Nuliparidade ou gestação multifetal
Lúpus ou síndrome antifosfolípide	Descolamento de placenta prévio
IMC prévio >30 ou reprodução assistida	Restrição de crescimento ou natimorto prévio

Profilaxia na gestante de maior risco

- 01 AAS: 100–150 mg à noite, conforme a DBHA.
- 02 Iniciar antes de 16 semanas e manter até 36 semanas, segundo o texto.
- 03 Avaliar cálcio em gestantes de alto risco com baixa ingestão.
- 04 Estimular atividade física quando não houver contraindicação.

Gestação: limiar de ação e meta

Gravidade

PAS ≥ 160 ou PAD ≥ 110 mmHg exige confirmação rápida e tratamento urgente se persistente.

Controle continuado

Definir plano obstétrico individual. O capítulo apresenta recomendações de baixa certeza para metas e início na HA não grave.

Gestação: medicamentos para manutenção

- 01 Metildopa é opção de primeira linha na DBHA.
- 02 Nifedipina de longa duração e anlodipino também são opções.
- 03 Iniciar com um agente e associar outro se necessário.
- 04 Acompanhar PA, tolerância e condição materno-fetal.

Gestação: fármacos a evitar

Classe ou fármaco	Orientação da DBHA
IECA e BRA	Contraindicados na gestação
Atenolol	Não recomendado por risco fetal
Antagonistas mineralocorticoides	Não recomendados na gestação
Prazosina	Não recomendada no quadro final

Sinal de alerta obstétrico

≥ 160 ou ≥ 110

PAS ou PAD em mmHg. Se persistente por 15 minutos, requer tratamento urgente.

HA grave: princípios de atendimento

- 01 Encaminhar para avaliação e tratamento em ambiente assistencial.
- 02 Monitorar a mãe e avaliar o feto.
- 03 A DBHA cita hidralazina intravenosa e nifedipina oral para controle urgente.
- 04 Nifedipina sublingual não deve ser utilizada.

Sulfato de magnésio e anti-hipertensivo

Sulfato de magnésio

Prevenção da eclâmpsia na HA grave sintomática e tratamento da eclâmpsia.

Anti-hipertensivo

Controle da PA para reduzir complicações maternas.

Caso 3: 30 semanas, cefaleia e PA 166/112

- 01 Gestante relata cefaleia intensa e alteração visual.
- 02 A PA permanece elevada após confirmação rápida.
- 03 É adequado esperar quatro horas ou solicitar MRPA?
- 04 Quais prioridades devem orientar a conduta imediata?

Puerpério: o parto não encerra o risco

- 01 Manter vigilância da PA e de sinais de gravidade.
- 02 Eclâmpsia, AVC, edema pulmonar e lesão renal ainda podem ocorrer.
- 03 Rever medicamentos conforme evolução e amamentação.
- 04 Programar reavaliação e transição para o cuidado longitudinal.

Aleitamento: opções citadas pela DBHA

Medicamento	Classificação do quadro 10.3
Nifedipina	Permitido
Enalapril ou captopril	Permitido sem restrição no quadro
Metoprolol ou propranolol	Permitido
Hidralazina ou metildopa	Permitido

Aleitamento: situações que pedem cautela

Medicamento	Orientação do quadro 10.3
Clonidina e atenolol	Evitar
Clortalidona	Evitar pela eliminação lenta no recém-nascido
Hidroclorotiazida	Usar dose baixa, <50 mg/dia
Furosemida	Pode diminuir a produção de leite
BRA	Dados insuficientes, preferir outra opção

Após HA na gestação: prevenção de longo prazo

- 01** Registrar o antecedente na história cardiovascular.
- 02** Acompanhar PA e fatores de risco ao longo dos anos.
- 03** Reavaliar função renal e risco cardiometabólico.
- 04** Orientar planejamento de futuras gestações.

Oficina: qual informação muda a decisão?

Caso fictício	Ponto a discutir
15 anos, PA 134/84 confirmada	Limiar pediátrico e MAPA
84 anos, quedas após ajuste	Ortostase e fragilidade
Mulher em BRA deseja engravidar	Revisão antes da concepção
Puérpera amamentando, HA persistente	Opções compatíveis e seguimento

Quatro decisões para a prática

- 01** Usar a referência correta para idade, método e gestação.
- 02** No idoso, orientar a intensidade pela função e pela tolerância.
- 03** Revisar o tratamento nas transições reprodutivas.
- 04** Manter seguimento cardiovascular após hipertensão gestacional.

Referências da aula

Brandão AA et al.

Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial – 2025.
Arq Bras Cardiol. 2025;122(9):e20250624.
DOI: 10.36660/abc.20250624

Feitosa ADM et al.

Diretrizes Brasileiras de Medidas da Pressão Arterial
Dentro e Fora do Consultório – 2023.
Arq Bras Cardiol. 2024;121(4):e20240113.
DOI: 10.36660/abc.20240113